

Информация о способах преодоления и лечения никотиновой зависимости

Курение табака занимает первое место в мире среди предотвратимых причин смертности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует, что курение табака убивает до половины людей, которые его употребляют. По данным ВОЗ, за весь XX век табакокурение явилось причиной преждевременной смерти 100 миллионов человек по всему миру и в XXI веке их число возрастёт до миллиарда.

Люди, находящиеся рядом с курильщиками и вынужденные вдыхать табачный дым, заболевают раком столь же часто, как и курящие. Безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма не существует.

По степени опасности для здоровья и по уровню негативного влияния на организм человека курение можно сравнить с алкогольной или наркотической зависимостью. Разрушительное действие этой вредной привычки человек ощущает далеко не сразу – именно поэтому многие курильщики не желают признавать факт медленного уничтожения своего собственного здоровья. Они утверждают, что не зависят от регулярных перекуров, но это в корне не так. Доказательством может служить то, насколько трудно бывает отказаться от вожделенной сигареты.

Постепенно курильщик становится зависимым от сигареты. Выкуренная сигарета позволяет лучше сосредоточиться, снять напряжение, приносит удовольствие. Но организм человека требует постоянного поступления никотина, а в случае отказа от курения возникают агрессия и раздражительность, проблемы со сном, снижение концентрации внимания, подавленное настроение, повышение аппетита и невыносимое желание покурить.

Негативно отражаются на состоянии здоровья людей и употребление ими нетабачных никотиносодержащих изделий, которые предназначены для сосания, жевания или нюханья.

Около 90% взрослых курильщиков пытаются прекратить курить самостоятельно. Причиной этому обычно являются проблемы со здоровьем, забота о здоровье семьи или будущем ребенке, желание быть примером для детей, освобождение от зависимости, давление окружающих и желание улучшить свой внешний вид. В то же время около 70% прекративших курение в течение 3 месяцев, как правило, возобновляют курение. В начальный период после отказа от курения человек подвержен перепадам настроения, бессоннице, поэтому перед

тем, как бросить курить, особенно важно проконсультироваться с врачом и первое время сохранять с ним контакт.

После трех безуспешных самостоятельных попыток прекратить курение рекомендуется прибегнуть к психотерапевтическому и лекарственному лечению зависимости от никотина.

Лица, которые желают бросить курение, могут получить консультацию по данному вопросу у врача-психиатра-нарколога или врача-психотерапевта. Наркологические кабинеты для лечения пациентов с табачной зависимостью имеются во всех областных центрах, а также входят в состав областных (городских) наркологических диспансеров (список организаций, осуществляющих лечение табачной зависимости прилагается).

Врач-психиатр-нарколог консультирует пациента, проводит при необходимости его обследование и даёт рекомендации как бросить курить. При необходимости назначает курс лечения. Лечение проводится амбулаторно, анонимно и в основном на платной основе.

Лечение табачной зависимости – это очень важный и сложный шаг в жизни каждого человека, страдающего такой формой зависимости. Основная причина заключается в отсутствии свободы, в постоянной необходимости иметь под рукой пачку сигарет. В противном случае человек чувствует легкое раздражение и волнение, которое способно перерасти в более сильную агрессию и нервозность.

Еще одной, более весомой причиной является состояние здоровья человека. Легкие в быстром темпе засоряются вредными веществами, развивается сильный кашель, происходит изменение голоса. Кожа приобретает желтый оттенок, начинается сильная одышка при физической активности. Организм стареет гораздо быстрее, чем у некурящего человека. Дальнейшее курение грозит развитием рака легких и многих других серьезных заболеваний. К тому же, доза никотина, необходимая зависимому человеку, постоянно увеличивается и вынуждает тем самым покупать сигареты все чаще и чаще. Лечение курения нужно проводить как можно быстрее, ведь с каждым днем степень зависимости возрастает.

Отказ от курения влечет за собой следующие позитивные изменения в состоянии человека:

- через 8 часов уровень кислорода в крови возвращается к норме;
- через 12 часов окись углерода от курения выйдет из организма полностью, лёгкие начнут функционировать лучше, пройдёт чувство нехватки воздуха;
- через неделю улучшится цвет лица;

- через 7-9 недель тонкие обонятельные каналы окончательно очищаются от смолы и копоти, и острота запахов приобретёт неожиданно «яркое звучание»;
- через 12 недель (3 месяца) функционирование системы кровообращения улучшается, что позволяет легче ходить и бегать;
- через 3-9 месяцев жизненная емкость лёгких увеличивается на 10 %;
- имеются данные о заметном улучшении памяти у людей, бросивших курить;
- через 5 лет в 2 раза сокращается вероятность заболеть онкологическими заболеваниями.

Лечение табачной зависимости

Лечение пациента от табачной зависимости можно условно разделить на два этапа:

Сначала происходит избавление от физических проявлений зависимости. Очищается организм пациента, проводятся различные дезинтоксикационные мероприятия. Нормализуется работа внутренних органов, выводятся вредные вещества, происходит оздоровление крови.

После избавления от физических проявлений зависимости можно начинать психотерапевтическое и психологическое воздействие. С пациентом проводятся беседы, сеансы гипноза, выясняются причины возникновения пагубной страсти, устраняются страхи и тревоги, идет активная работа по созданию благоприятных установок на успешный результат. Специалисты предпринимают все возможное, чтобы облегчить трудный для пациента период отказа от курения, сделать его безболезненным.

Психотерапевтическое лечение табачной зависимости включает различные программы отказа от курения, основанные на поведенческой и когнитивной психотерапии:

1. Поведенческая терапия включает «самоуправление» – пациент обучается «самоконтролю», записывая условия, при которых усиливается желание курить. Пациент также осуществляет «контроль над стимулами», при котором стимулы, побуждающие к курению, исключаются из окружающей обстановки. Курение может ассоциироваться с ключевыми моментами поведения в течение дня (желание закурить утром после пробуждения, прием кофе или чая, прибытие на работу, обеденный перерыв, после еды, после работы, перед сном и др.).

Используется также метод «никотинового затухания», или постепенного снижения потребления никотина за счет выкуривания

одинакового количества сигарет, но с все более низким содержанием никотина.

2. Когнитивная терапия никотиновой зависимости включает:

- детальный анализ мыслей, чувств и поведения курильщика;
- анализ мотивации отказа от курения и изменения этой мотивации;
- заключение терапевтического договора с распределением ответственности между терапевтом и пациентом;
- ведение дневника мыслей, чувств и поведения, а также стимулов и способов преодолении «тяги»;
- реструктурирование образа жизни и приобретение новых занятий.

Человек, желающий бросить курить, должен избегать употребления алкоголя, кофе и других снижающих контроль веществ, курящих компаний и т.п. Ему необходимо учитьсяправляться с плохим настроением, стрессом и скучой без «химических костылей» – сигарет и алкоголя.

Фармакологическое лечение табачной зависимости заключается в адекватной замене никотина во время острого никотинового синдрома отмены с помощью никотинзаместительной терапии.

Это лечение необходимо лицам, которые выкуривают более 20-ти сигарет ежедневно, а также тому, кто выкуривает первую сигарету в течение 30-ти минут после пробуждения, и лицам, уже имевшим неудачные попытки бросить курить (сильное влечение к сигаретам в первую неделю отмены).

К видам лекарственной терапии никотиновой зависимости, эффективность которых доказана клиническими исследованиями, относят заместительную никотиновую терапию, антидепрессанты и применение агонистов никотиновых рецепторов. Сам факт назначения лекарств (плацебо-эффект) повышает частоту отказа от курения до 10%.

Сочетание назначения лекарств с проведением когнитивно-поведенческой психотерапии более эффективно, чем только прием лекарств или психотерапия, и до 30% повышает частоту отказа от курения у зависимых от никотина лиц.

Способы отказа от курения

Существуют два основных способа отказа от курения: однократный, при котором человек бросает курить раз и навсегда, и постепенный, медленный, поэтапный.

Первый способ вполне пригоден для лиц, только начавших курить, детей, подростков, у которых явления абstinенции при отказе от курения бывают выражены слабо и легко переносимы.

Второй способ – чаще рекомендуют курильщикам со стажем или в возрасте старше 50 лет.

Внезапно перестать курить лучше в спокойной обстановке, заранее настроить себя на этот решительный шаг. Лучше всего наметить для себя конкретную дату (через 2-3 недели). Стоит предупредить знакомых или родственников, что Вы собираетесь бросить курить, они постараются помочь.

Другие методы преодоления табачной зависимости

1. Самопомощь: чтение специальной литературы («Легкий способ бросить курить» и пр.), освоение методов саморегуляции.

2. Гипнотерапия (как персональные, так и групповые сеансы гипноза).

3. Лечение физиотерапевтическими процедурами (иглорефлекстерапия, использование лазера, транскраниальная электростимуляция).

Заведующий сектором наркологии
ОМО РНПЦ психического здоровья

М.Г.Будняк

Врач-эпидемиолог ОМО
РНПЦ психического здоровья

С.П.Молодых

**Список
организаций, осуществляющих лечение никотиновой зависимости**

№	Наименование организации	Адрес	Телефон	Сайт
1	Учреждение здравоохранения «Городской клинический наркологический диспансер»	г. Минск ул. Гастелло, 16	(8017) 3570909 (29) 1490909	http://gknd.by/
2	Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»	г. Минск ул. П.Бровки, 7	2709064 (29)1017373 (29)7746659	https://mokc.by/
3	Молодечненский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения "Молодечненская центральная районная больница"	г. Молодечно, ул. В.Гастинец, 58	(80176)-581602 581603	http://mpnd.by/
4	Солигорский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения "Солигорская центральная районная больница"	г. Солигорск ул. Молодежная, 5а	(80174) 260426	http://soligorskcrb.b y/struktura/ meditsinskie- uchrezhdeniya-g- soligorska/soligorski j- psikhonevrologiches kij-dispanser
5	Борисовский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения «Борисовская центральная районная больница»	г. Борисов ул. Связная, 47	(80177) 976708	Borisov.pnd@tut.by
6	Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»	г. Гродно ул. Г. Обухова, 15	(80152) 398369	<a href="http://www.mmc.gro
dno.by/">http://www.mmc.gro dno.by/

7	Лидский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения "Лидская центральная районная больница"	г. Лида ул. Кирова, 16	(80154) 658297	http://crb.lida.by/Lech_set/s_psix_disp.html
8	Слонимский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения "Слонимская центральная районная больница"	г. Слоним ул. Советская, 56	(801562) 66501	https://www.spr.by/slonym/dispenser-psihonevrologi
9	Волковысская ЦРБ	Г. Волковыск ул. Боричевского, 1а	(801512) 59032	https://volrb.by
10	Учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии»	г. Витебск ул. Терешковой, 30	(80212) 614581	http://www.vit.pnd.vitebsk.by/ru/
11	Учреждение здравоохранения «Полоцкая областная психиатрическая больница»	г. Полоцк ул. 23 Гвардейцев, 4а	(80214) 773217	http://psixbolnicapolotsk.by/
12	Новополоцкий психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения "Новополоцкая центральная городская больница"	г. Новополоцк ул. Гайдара 4	(80214) 509677	http://www.ncgb.by/index.php/podrazde niya/59-psikhonevrogicheskij-dispanser
13	Учреждение здравоохранения «Могилевский областной наркологический диспансер»	г. Могилев пер. 4 Мечникова	(80222) 728349	http://mond.by/

14	Филиал «Бобруйский наркологический диспансер» УЗ «Бобруйская центральная больница»	г. Бобруйск ул. Гагарина, 4	(80225) 709759	http://bgbsmp.by/sample-page/об учреждении/структурные учреждения/филиал-бобруйский-межрайонный-псих/
15	Учреждение здравоохранения «Брестский областной наркологический диспансер»	г. Брест пер. Брестских дивизий, 2	(80162) 534702	http://narcologia.by/
16	Филиал «Межрайонный наркологический диспансер» учреждения здравоохранения "Пинская центральная поликлиника"	г. Пинск ул. Рокоссовского, 8	(80165) 669420	http://pcp.by/mezhrajonnyj-narkologicheskij-dispans/obshhaja-informacija/
17	«Барановичский межрайонный наркологический диспансер» учреждения здравоохранения "Барановичская центральная поликлиника"	.г. Барановичи ул. Парковая, 53	(80163) 480270 676812	http://barcp.by/index.php/poliklinike/uchrezhdeniya-zdravookhraneniya-g-baranovichi/27-uz-baranovichskij-mezhrajonnyj-narkologicheskij-dispanser
18	Учреждение «Гомельский областной наркологический диспансер»	г. Гомель ул. Никольская, 26а	(80232) 340146 340166	http://narcology.by/
19	Светлогорский психонаркологический диспансер учреждения здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница"	г. Светлогорск ул. Школьная, 4	(802342) 48652	http://svetcrb.by/index.php/psikhonarkologicheskij-dispanser

20	Мозырский психоневрологический диспансер учреждения здравоохранения "Мозырская центральная городская поликлиника"	г. Мозырь ул. Малинина, 9	(80236) 252899 252766	http:// http//.mcgp.by
21	Речицкий психонаркологический диспансер учреждения здравоохранения "Речицкая центральная районная больница"	г. Речица ул. Трифонова, 117	(802340) 99306	http://med.rechitsa.b y/ru/psychiatricdispe nsary
22	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152	2898034	https://www.mentalhealth.by/